〔症例１[1)]〕女性　70歳代　使用理由：一過性脳虚血発作疑い　合併症：神経因性膀胱

投与開始

1日目	18日目頃	25日目	26日目	27日目	28～29日目	30日目	31日目	32日目	49日目
投与開始 回転性めまいのため、	倦怠感が増強 上腹部痛、嘔気、嘔吐（＋） 止瀉剤追加でも軽快せず 頻回の下痢（＋）	軽快せず 近医で三剤（＊）追加	夜間、頭部掻痒が出現 倦怠感著明	凍結血漿（10U）投与 早朝、救急外来受診	凍結血漿（40U）にて血漿交換 呼名への反応（＋）、開眼、発語（－） 意識レベル低下	凍結血漿（40U）にて血漿交換 呼名への反応、開眼（＋）	凍結血漿（30U）にて血漿交換	意識レベルほぼ正常化 倦怠感著明であるが、会話可能	回復

塩酸チクロピジン　200mg/日

メシル酸ベタヒスチン　18mg/日

約3年前～　塩酸オキシブチニン　6mg/日

血漿交換

（＊：ジアスターゼ配合剤，アズレンスルホン酸ナトリウム製剤，耐性乳酸菌配合剤）

	18日目頃	27日目	28日目	30日目	32日目	35日目	49日目
体温　(℃)		36.9	37.8	37.4	37.1	38.5	37.4
RBC（10^4/mm^3）		343	285	256	281	288	272
Hb　(g/dL)	14.4	11.7	9.6	8.6	9.3	9.3	9.3
PLT（10^4/mm^3）	13.6	<1.0	<1.0	1.1	4.8	10.3	18.1
破砕赤血球		＋	＋	＋	＋	＋	＋
LDH　(IU/L)	492	3059	3267	1235	573	494	404
t-Bil　(mg/dL)	0.39	4.7	4.2	2.1	0.9	0.6	0.4
BUN　(mg/dL)		71.6	67.6	30.6	24.9	35.3	19.3
s-Cr　(mg/dL)		2.1	1.8	1.2	1.2	1.2	0.9

〔症例２[2)]〕女性　50歳代　使用理由：一過性脳虚血発作　合併症：なし

投与開始

1日目	20日目	22日目	23日目	24日目	25日目
塩酸チクロピジン他三剤投与開始 知覚麻痺と構語障害のため	全内服薬を中止 全身に皮下出血斑出現 神経症状は一時的に改善 入院後、脳梗塞に対し点滴開始 脳梗塞症状の増強により入院	37℃台の発熱 血小板減少、LDHの上昇を認める	便潜血（＋） 右季肋部～側腹部痛（＋）	腹部痛及び意識障害が増強 血尿（＋）	午後　大声を発生、血圧低下 昼　ICU入室 朝　全身性痙攣出現 人工呼吸開始 血漿輸注、プレドニゾロン投与 血漿交換（20U） 血圧低下著明 死亡

塩酸チクロピジン　200mg/日

酒石酸イフェンプロジル　60mg/日
ロキソプロフェンナトリウム180mg/日

乳酸リンゲル液（デキストラン40添加）　500mL/日
オザグレルナトリウム　160mg/日

血漿交換

	1日目	22日目	23日目	25日目	
RBC（10^4/mm^3）	424	424		250	224
Hb　(g/dL)	12.5	12.6		7.4	6.6
PLT（10^4/mm^3）	14.8	1.4		≦1.0	≦1.0
破砕赤血球				＋	
LDH　(IU/L)	338	1567	3128		
t-Bil　(mg/dL)	0.4	3.0	3.8	4.3	4.8
BUN　(mg/dL)	9.9	20.7		64.1	65.9
s-Cr　(mg/dL)	0.7	0.8		1.6	1.6